

ASTARA RAYONU ƏRAZISİNDƏ KƏKLİKOTULU-LƏRGƏLİ-TOPALLIQ FORMASIYASININ MƏHSULDARLIĞI, YEM KEYFİYYƏTİ VƏ TUTUMU

Sənubər Aslanova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, aslanova17.02@mail.ru

Formasiyanın bitki örtüyü Astara rayonu ərazisində meşə altından çıxmış dağ-qəhvəyi torpaqlarda, 8 №-li «Türkəsoba» yay (otarılmayan) otlaq sahəsində qeydə alınmışdır. Bu rayonun iqliminə xas havanın orta illik temperaturu 10-14°C, yağıntının illik miqdarı isə 1400-1600 mm-dir.

Araşdırmalar göstərir ki, bu formasiyanın bitki örtüyü müxtəlifotlu-paxlalı-taxılotalıq formasiya sinfinə aiddir. Həmin formasiya sinfinin kəklilikotulu-lərgəli-topallıq formasiyasının 2019-2021-ci illərin yay fəsilələrində məhsuldarlığı yaş kütlədə 19,5-29,6 s/ha, quru kütlədə 7,8-12,9 s/ha həddində dəyişmişdir (cədvəl 1). Hesablamalara görə, məhsuldarlığın yaş kütləsinin quru kütləsinə çevrilmə əmsali 2,3-2,5-ə uyğundur.

1 saylı cədvəldən göründüyü kimi, kəklilikotulu-lərgəli-topallıq formasiyasının orta illik məhsuldarlığı botaniki qruplar üzrə dəyişkəndir. Belə ki, 2019-cu ilin yayında 7,8 s/ha quru kütlədə taxılotalar 3,6 s/ha (46,1%), paxlalıotlar 2,7 s/ha (34,7%), müxtəlifotlar 1,5 s/ha (19,2%), 2020-ci ildə 10,2 s/ha-da – taxılotalar 6,1 s/ha (59,8%), paxlalıotlar 2,5 s/ha (24,5%), müxtəlifotlar 1,6 s/ha (15,7%), 2021-cü ildə 12,9 s/ha-da – taxılotalar 6,7 s/ha (51,9%), paxlalıotlar 3,8 s/ha (29,5%), müxtəlifotlar isə 2,4 s/ha (18,6%) həddində tərəddüd etmişdir.

Cədvəl 1. Astara rayonunun 8 №-li «Türkəsoba» yay otlaq sahəsində yayılan *Thymuseta-Vicaetum-Festucosum* formasiyasının orta illik məhsuldarlığı

İllər və aylar	Botaniki ot qrupları	Yaş kütlə		Quru yeyilən kütlə	
		s/ha ilə	%-lə	s/ha ilə	%-lə
2019-cu il (10-20.VII)	Taxılotalar	9,0	46,1	3,6	46,1
	Paxlalıotlar	6,8	34,9	2,7	34,7
	Müxtəlifotlar	3,7	19,0	1,5	19,2
	Orta illik məhsuldarlıq	19,5	100,0	7,8	100,0
2020-ci il (20-25.VII)	Taxılotalar	15,2	59,6	6,1	59,8
	Paxlalıotlar	6,3	24,7	2,5	24,5
	Müxtəlifotlar	4,0	15,7	1,6	15,7
	Orta illik məhsuldarlıq	25,5	100,0	10,2	100,0
2021-ci il (25-30.VII)	Taxılotalar	16,6	56,1	6,7	51,9
	Paxlalıotlar	7,3	24,7	3,8	29,5
	Müxtəlifotlar	5,7	19,2	2,4	18,6
	Orta illik məhsuldarlıq	29,6	100,0	12,9	100,0

2 saylı cədvəldən göründüyü kimi, kəklilikotulu-lərgəli-topallıq formasiyasının üçillik orta məhsuldarlığı (10,1 s/ha), 100 kq quru yemdə yem vahidi (45,8 kq), fitosenozun istifadə müddəti (120 gün) və davarın (qoyun-keçilərin) gündəlik yem normasını (1,3 yem vahidi) nəzərə almaqla, hektarda 3,0 baş davar, ümumi sahədə (90 ha) isə otlaq tutumu (270 baş kiçik buynuzlu mal-qara otarmaq mümkündür) müəyyən edilmişdir.

Beləliklə, Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosisteminin biomüxtəliflik üzrə məhsuldarlığı, yem keyfiyyəti və otlaq tutumuna dair apardığımız tədqiqatlardan bu qənaətə gəlirik ki, Yardımlı, Lərik və Astara rayonları ərazilərindəki yay otlaqlarının 35-40% sahələrinin səmərəsiz istifadəsi, tutumundan artıq otarılması səbəbindən məhsuldarlığı aşağı düşmüş və fitomüxtəlifliyi deqradasiyaya məruz qalmışdır.

Cədvəl 2. Bəzi bitki formasiyalarında 2019-2021-ci illərin yay fəsillərində fitosenozların istifadə müddəti, orta məhsuldarlığı, yem keyfiyyəti və otlaq tutumu

s/s	Formasiyalar	İstifadə müddəti (günlə)	Orta məhsuldarlıq (yeyilən quru kütlədə)	100 kq yem- də		Hektarda otarılması mümkün olan kiçik buyunuzlu mal-qaranın sayı (vükü)	Sahəsi (ha-la)	Otlığın tutumu
				Yem vahidi	Mənimənilən protein			
1.	Kəklkotulu-şiyavlı-topallıq	120	8,1	44,7	4,9	2,3	333	766
2.	Yoncalı-kəklkotulu-topallıq	120	10,9	55,3	5,6	3,9	296	1154
3.	Kəklkotulu-lərgəli-topallıq	120	10,1	45,8	4,6	3,0	90	270

Regionun təbii yay otlaqlarında fitosenozlarının qorunması, səmərəli (düzgün) istifadəsi və yaxşılaşdırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsəduyğundur.