

VITEX CİNSİNƏ AİD OLAN *Vitex agnus-castus* NÖVÜNÜN ABŞERONDA İNTRODUKSİYASI VƏ EFİRYAĞLILIĞI

İradə Məmmədova, Afət Bağırılı

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu, irade_mamedov@mail.ru

Azərbaycan florasına daxil olan bitkilərin 1500-dən çox növü dərman əhəmiyyətlidir ki, onların da təxminən 800-ü efiryağlı bitkilərə aiddir. Efiryağlı bitkilərin kompleks bioloji aktiv maddələrə malik olması tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmamış, bu sahədə müxtəlif aspektli genişmiqyaslı araşdırmaların aparılmasına səbəb olmuşdur. Ədəbiyyat məlumatlarına görə, dünya əhalisinin 80%-i bitkilərdən alınan dərmanlardan istifadə edir. Aromatik bitkilərin əksəriyyəti müəyyən bir dozada mikroböldürücü xüsusiyyətə malik olur. Həmin bitkilərin efir yağlarının tərkibini əsas etibarilə terpenlərdən ibarət qarışıqlar təşkil edir. Bu cür perspektivli efiryağlı bitkilərdən biri Abşeronun iqlim şəraitində yaxşı becərilən *Viteks agnus-castus* L. – Adi ərgüdədir.

Viteks agnus-castus – Adi ərgüdə – *Verbenaceae* Jaume – Hil (Müqəddəs ağac, İbrahim ağacı, Monastır bibəri də deyilir) Minaçiçəyikimilər fəsiləsinin Ərgüdə cinsinə daxildir. Adi ərgüdə toxumu 1951-ci ildə Batumi Botanika bağından gətirilərək Dendrologiya İnstitutunda introduksiya olunmuşdur.

Bitki yabanı halda Aralıq dənizyanı ölkələri, Şimali Amerika, Şimal-Şərqi Afrikada tropik və subtropik zonalarda, Kiçik Asiya, İran, Krasnodar, Qafqazda, Krımın meşə və qoruqlarında yayılmışdır. Yarpaqlarını tökən, genişcətirli, 3 m-ə qədər hündürlüyü olan ağacdır. Bozumentul bənövşəyi rəngli, ətirli çiçəkləri budaqların uclarında sıx, salxım halında olur. Yarpaqları qarşı-qarşıya yerləşən 3-7 yarpaqcıqdan ibarət barmaqşəkilli mürəkkəb yarpaqdır. Boruşəkilli çiçəkyanlığı beşüzv-lüdür. Kasacıq boruşəkilli olub, beşdişciklidir. Erkəkciyi dörd ədəd olmaqla çiçək tacından xaricə çıxır. Çiçək tacı sıx çiçək qrupunda yerləşir. İyun ayından sentyabra kimi çiçəkləyir, çiçəkləyəndə olduqca gözəl görünür. Kiçik, kürəşəkilli, qaramtıl meyvələri əzildikdə istiot dadı verir. Tozlanması həşəratlar vasitəsilə gedir. Bitki çox güclü və xoş ətrə malikdir. Meyvələri oktyabr-noyabr aylarında yetişir. Gözəl balverən bitkidir.

Tədqiqatlar 2020-2021-ci illərdə Dendrologiya İnstitutunun Ağac-kolların introduksiyası və iqlimləşdirilməsi və Efiryağlı bitkilər laboratoriyalarında aparılmışdır. Adi ərgüdənin toxumla çoxaldılması Q.A.Firsova (1955), cücərtilərin morfoloji xüsusiyyətləri İ.T.Vasilçenko (1960), illik boy artımı A.A.Molçanov (1967) metodikaları əsasında öyrənilmişdir. Tədqiqat zamanı yerli şəraitdə yığılan toxum materiallarından istifadə edilmişdir. Toxumların cücərmə qabiliyyətinin səpin vaxtından asılılığı öyrənilmişdir. Aparığımız fenoloji müşahidələrdən müəyyən olmuşdur ki, adi ərgüdə bitkisi Abşeron şəraitində bol çiçəkləyir və çoxlu miqdarda toxum əmələ gətirir. Toxumla aparılan səpinlərin nəticəsi cədvəl 1-də əks olunmuşdur.

Bu bitki həmçinin vegetativ yolla da çoxaldılır. Bizim təcrübələrdə onlardan yalnız biri – odunlaşmış qələmlərlə çoxaltma üsulu tətbiq edilmişdir. Vegetativ çoxaltma institutun təcrübə sahələrində açıq şəraitdə aparılmışdır. Bunun üçün qələmlər birillik zoğlardan 20-25 sm uzunluğunda kəsilib hazırlanmışdır. Qələmlər iki dövrdə, mart-aprel aylarında əkilmişdir (cədvəl 2).

Laboratoriya şəraitində yeni yarpaqların efiryağlılığının müəyyənləşdirilməsi Klevendjerin hidrodistilyasiya üsulu ilə, uçucu yağların komponent tərkibi isə "Chromatek-Crystal 2000 M" qazmaye xromatoqrafiyasında aparılmışdır. Efir yağının əsas komponentlərinin çəki nisbəti xromatoqrafda qazoxromatoqrafiya üsulu ilə kapilyar sütun vasitəsilə müəyyən edilmişdir. Komponentlərin kütlələrini hesablamaq üçün normallaşdırma üsulundan istifadə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ərgüdə yarpaqlarındakı efir yağının konsentrasiyası 0,45% və açıq sarımtıl rəngli mayedir. Yarpaqların efir yağında 20 komponent identifikasiya edilmişdir və əsas maddələr 1,8-sineol (28,3%), β-пинен (13,1%)-dir.

Cədvəl 1. Tədqiq olunmuş növün toxumunun səpin nəticəsi və cücərmə faizi

Növ	Səpin vaxtı		Yazda əkilmiş toxum		Payızda əkilmiş toxum	
	Yaz	Payız	Cücərmə vaxtı	Cücərmə %	Cücərmə vaxtı	Cücərmə %
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	25.03.2021	10.11.2021	17.04.2021	70	20.04.2021	70

Cədvəl 2. *Vitex agnus-castus* L. növü qələmlərinin boy artımı

Növ	Qələmlərin sayı	Qələmlərin basdırılma vaxtı	Kök alma %-i	Ayılma vaxtı	Böyümənin başlanması	1 illik zoğların uzunluğu, sm					
						İyun		İyul		Avqust	
						15	30	15	30	15	30
<i>Vitex agnus castus</i>	50	01.03.16	7-14	10.05	18.05	30	33	60	63	90	94
		27.04.17	10-18	25.05	31.05	16	22	40	43	85	97

Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, bitkinin vegetativ yolla çoxaldılması daha perspektivli olur. Xammalın yarpağından alınan yağ daha çox yüksək təsirə malikdir və güclü antitimikrob xüsusiyyətli maddələrlə zəngindir. Qadın xəstəliklərinin demək olar ki, hamısında bitkinin yarpağından və toxumundan istifadə edilir. Bir çox dövlətlərin, xüsusilə Şərqi ölkələrinin kulinariyasında yarpaq və meyvələri ət yeməklərinə, şorbalara, kolbasalara, balıq konservlərinə, mürəbbələrə əlavə olunur. Əsasən kosmetika, dərman, qida sənayesi, aromaterapiya və fitoterapiya sahələrində tətbiq edilir. Həmçinin gözəl dekorativ və ətirli çiçəkləri olduğuna görə yaşıllaşdırma-da istifadəsi məqsədəuyğundur.